

# 上肢運動機能評価(ぼんばあ用)

H 年 月 日

| 動作評価項目        |                             | 使用頻度(AOU) | 動作の質(QOM) |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| ①             | 本/新聞をめくって読む                 |           |           |
| ②             | コップを左手に持って右手で洗う             |           |           |
| ③             | 両手で顔を洗う                     |           |           |
| ④             | 書類を揃える際に、両手で行う              |           |           |
| ⑤             | タオルを絞ってテーブル拭き               |           |           |
| ⑥             | ボタンエイドで袖ボタンをはずす             |           |           |
| ⑦             | パソコンを打つ(Ctrl、Shift、Alt)、開ける |           |           |
| ⑧             | 左手で吊革を持つ                    |           |           |
| ⑨             | 携帯電話を左手に持って操作する             |           |           |
| ⑩             | エレベーターのボタンを押す               |           |           |
| ⑪             | お椀を把持して食事をとる                |           |           |
| ⑫             | 引き出しの開け閉め                   |           |           |
| ⑬             | 両手で物を運ぶ                     |           |           |
| ⑭             | 財布の開け閉め                     |           |           |
| 合計            |                             |           |           |
| 平均(合計÷該当動作項目) |                             |           |           |

27.4.21更新

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 満足度 | % | 体重維持は？ |
|-----|---|--------|

## 使用頻度(AOU)の評価

- 0. 左手はまったく使用していない(0%)
- 1. 場合により左手を使用するが、きわめてまれである(5%)
- 2. 時折左手を使用するが、ほとんどの場合は右手のみを使用(25%)
- 3. 脳卒中発症前の使用頻度の半分程度、左手を使用(50%)
- 4. 脳卒中発症前とほぼ同様の頻度で、左手を使用(75%)
- 5. 脳卒中発症前と同様の頻度で、左手を使用(100%)

## 動作の質(QOM)

- 0. 左手はまったく使用していない(不使用)
- 1. 動作の過程で左手を動かすが動作の助けにはなっていない(ほとんど使えない)
- 2. 動作に左手を多少使用しているが、右手の介助が必要、または動作が緩慢か困難。  
(不十分)
- 3. 動作に左手を使用しているが動きがやや緩慢または力が不十分(やや正常)
- 4. 動作に左手を使用しており、動きもほぼ正常だが、スピードと正確さに劣る(ほぼ正常)
- 5. 脳卒中発症前と同様に、動作に左手を使用(正常)